

## MANUAL DE EMPLEO



### Instrucciones de uso

Mezcle el producto con la cantidad de agua requerida para aplicar las dosis indicadas en el siguiente cuadro:

Tipo de nematodo	Dosis/ha	Intervalo de aplicación
Mosca blanca ( <i>Bemisia spp</i> )	2-3 lts	8 – 14 días
Minador de la hoja ( <i>Liriomyza spp</i> )	2-3 lts	8 – 12 días
Paratriozas ( <i>Paratrioza spp</i> )	2-3 lts	8 – 16 días
Trips ( <i>Thrips spp; Frankiniella spp</i> )	2-3 lts	8 – 12 días
Picudos ( <i>Anthonomus eugenii; A. grandis</i> )	2.5-3.5 lts	6 – 10 días
Chinches ( <i>Lygus spp</i> )	2-3 lts	8 – 16 días
Pulgones ( <i>Melanaphis spp, Aphis spp, Myzus spp</i> )	2-3 lts	8 – 12 días

No realice la mezcla en utensilios de metal. Para mayores beneficios se sugiere realizar las aplicaciones foliares muy temprano en la mañana o en la tarde, repitiendo las aplicaciones conforme al ciclo de vida del insecto a controlar. Agítese antes de usarlo y aplique con la

suficiente cantidad de agua procurando tener un cubrimiento uniforme del cultivo a tratar. Es importante estabilizar el pH del agua de 6 a 6.5 para una mejor acción de producto.

GrinSECTOR es compatible con fertilizantes foliares y otros insecticidas de uso común. No mezclarlo con productos muy alcalinos. El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco.



**Oriente 7 # 158, Ciudad Industrial  
Celaya, Gto. CP 38010**

**Teléfonos: (461) 6087503; 6088752**

**Celulares: (461) 2067629; 2275889**

**Correos: [info@bioqualitum.com](mailto:info@bioqualitum.com); [bioqualitum@gmail.com](mailto:bioqualitum@gmail.com)**

***[www.bioqualitum.com](http://www.bioqualitum.com)***